



LES RAVAGEURS DES ARBRES FRUITIERS

LE VER DES POMMES ET DES POIRES (Carpocapse)



Quels dégâts ?

Autour du trou d'entrée de la jeune larve dans le fruit, la zone est rongée. Puis elle creuse une galerie en spirale, prolongée par une galerie aboutissant directement aux pépins dévorés par la larve. Cela rend les fruits difficilement consommables. Une part de ces fruits, qui peut être importante, chute au sol et pourrit.



Sur quels arbres les trouve-t-on ?

Sur pommier bien sûr, et aussi sur poirier, abricotier, cognassier, noyer et parfois pêcher et prunier.



Quelles solutions biologiques ?

- Contre les papillons adultes :
 - Le piège à papillons dit « à entonnoir ».
 - La phéromone spéciale ver des pommes.
- Contre les larves hivernantes, à l'automne :
 - Les nématodes anti-chenilles du verger

Quand intervenir ?

Papillons adultes

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Larves sur fruits

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Larves hivernantes

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

